


다낭콩팥병, 오해? 진실! 2편

다낭콩팥병의 증상



다낭콩팥병에서 나타날 수 있는 증상

- 고혈압: 혈압이 이른 시기부터 발생
- 붉은 소변
- 뒤쪽 옆구리 통증




콩팥에 물혹이 커지는 것 외에 위와 같은 증상들이 나타나고
특히, 고혈압은 젊은 나이에 발생을 합니다.

“소변이 빨갛게 나오면 어떻게 하죠?”

무조건 다 위험한 것은 아닙니다.
먼저 충분한 휴식을 취해주세요.



다낭콩팥병의 경과



물혹의 개수와 크기 증가에 따라 **결국 콩팥의 기능이 악화** 됩니다.

65세 정도가 되면 평균 50%의 환자에서 콩팥 기능을 잃게 됩니다.

다낭콩팥병 환자 복막투석 가능할까?

다낭콩팥병 환자라고 복막투석을 못 하는 것은 아닙니다.
신장 크기가 아주 크지 않은 환자들에서는 복막투석도
가능합니다.



“아무런 증상이 없어도
콩팥의 기능이 나빠질 수 있나요?”

다낭콩팥병은 장기간 증상 없이도 콩팥 기능이
저하될 수 있습니다.

따라서 혈액 검사로 정확하게 콩팥의 기능을
평가하는 것이 좋습니다.



한쪽 콩팥에만 문제 있는 경우가 있나요?

- 전형적인 다낭콩팥병: 양쪽 콩팥에 물혹이 많이 있는 경우
- 비전형적인 다낭콩팥병: 한쪽에만 물혹이 매우 많거나 또는 부분적 물혹, 콩팥이 작은 크기로 유지

흔히 나타나는 증상은 아닙니다.



치료와 유전 관련 Q&A, 3편에서 계속

국민이 **건강한 삶**을
찾게 되는 그날까지
안전한 의학정보

weknew

X



이 콘텐츠는 위뉴와 [대한신장학회]가 함께 제작하였습니다.