


잘못 먹으면 콩팥에 치명적일 수 있는 진통제 1편

비스테로이드성 소염진통제



NSAID 진통제란?



진통제는 마약성 진통제와 비마약성 진통제로 나뉩니다.

NSAID 계열의 진통제

(Non-steroidal anti-inflammatory drugs,

**비스테로이드성 소염진통제)는 비마약성 진통제에 속하는
약들입니다.**

NSAID 진통제의 효과



- 염증 제거
- 통증 제거
- 해열 효과

수술 후 통증을 줄이거나, 치과에서 이를 뺀 후, 관절 통증이 있을 때 등의 경우에 NSAID 진통제를 먹습니다.

대중적인 NSAID 진통제

가장 대중적으로 사용되는 진통제인
타이레놀은 복용법만 잘 지킨다면
콩팥에 큰 문제를 일으키지 않습니다.




NSAID 진통제는 타이레놀처럼 처방전이 없어도
약국이나 편의점에서 쉽게 구할 수 있지만,
그만큼 복용에 주의가 필요합니다.

콩팥병 환자는 특히 조심

NSAID 진통제는 타이레놀처럼 흔하게 사용되는 진통제지만, 콩팥이 좋지 않은 사람들에게는 무리를 줄 수 있습니다.

콩팥 기능이 안 좋은 분들은 특히 조심해야 합니다.



만약 NSAID 진통제를 사용할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

모르핀, 코데인, 트리돌과 같은 마약성 진통제를 사용할 수 있지만 반드시 의사와 상의가 필요합니다.

“진통제보단 다른 치료가 더 좋아요.”



진통제를 먹으면 전신에 걸쳐 약의 반응이 일어나기 때문에 콩팥에도 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.

진통제에 복용에 따른 부작용이 우려되는 경우에는, 아픈 곳만 국소적으로 치료 등의 비약물 요법을 고려해 보는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다.

NSAID 진통제 복용 시 주의할 점, 그편에서 계속



소중한 사람들에게
올바른 건강 정보를
공유하세요



weknew