

## 위장관을 침범한 Wegener's granulomatosis 1예

인제대학교 서울백병원 내과학교실

박경준 · 총배천 · 권선옥 · 나현희 · 고행일

### A Case of Wegener

Park Kyung Jun, Tsung Pei Chuan, Kwon Sun Ok, Na Hyun Hee, Koh Haeng Il

Inje University Seoul Paik Hospital, Internal Medicine

**배 경** : Wegener's granulomatosis 는 전신적 혹은 국한적으로 혈관을 침범하여 괴사성 용종성 혈관염을 일으키는 질환이다. 위장관을 포함하여 여러 장기에 혈관염이 발생할 수 있는데 국내에서는 위장관을 침범한 증례가 보고된 바가 없어 보고하는 바이다.

**증 례** : 53세 남자로 2006년 5월 불명열로 내원하여 신조직검사에서 Wegener's granulomatosis를 진단받고 스테로이드 유지요법과 cyclophosphamide 충격요법을 병행하면서 치료중인 환자였다. 8번째 cyclophosphamide 충격요법을 받기 위해 입원하였고 입원당시 환자는 경한 복통을 호소하였다. cyclophosphamide 충격요법이 끝난 다음날 심한 복통과 함께 혈변이 동반되면서 환자의 전신상태가 급격하게 악화되었다. 응급으로 대장내시경을 한 결과 terminal ileum 상방에 혈관염으로 인한 다발성 출혈성 궤양을 발견하였다. 조직검사를 시행한 후 스테로이드 충격요법을 시작하였고 충격요법 3일째 혈변 및 복통이 호전되었고 이후 퇴원하였다. 그러나 대장조직검사에서 혈관염의 소견은 찾아 볼 수 없었다.

**고 찰** : 비록 대장조직검사에서 Wegener's granulomatosis 의 병리소견은 보이지 않았으나 환자의 임상경과 및 대장내시경 소견, 고용량 면역억제제 치료로 호전된 것으로 보아 Wegener's granulomatosis 가 위장관을 침범했음을 강력히 의심할 수 있었다.