

## 신증후군이 동반된 혈구탐식림프구조직구증 1예

원광대학교 의과대학 내과학교실

차정민 · 최지은 · 정덕은 · 이강원 · 김현정 · 이유민 · 안선호 · 송주홍

### A Case of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Associated with Nephrotic Syndrome

Jeong Min Cha, Jee Eun Choi, Duk Eun Jung, Kang Won Lee  
Hyun Jung Kim, Yu Min Lee, Seon Ho Ahn, Ju Hung Song

Department of Internal Medicine, Wonkwang University School of Medicine

**서 론:** 혈구탐식림프구조직구증은 활성화된 대식세포가 적혈구, 백혈구, 혈소판, 그리고 다른 전구세포 (precursor cell) 들을 삼켜버리는 조직소견을 보이는 질환으로 알려져 있다. 임상 증상으로는 고열, 간비종대, 범혈구감소증, 임파선비대, 황달, 혈액응고장애 등이 나타날 수 있으며, 신장의 합병증으로는 급성신부전이 가장 흔하다. 저자들은 혈구탐식림프구조직구증으로 진단된 61세 남자에서 신증후군이 동반된 예를 경험하였기에 보고하는 바이다.

**중 례:** 61세 남자 환자가 전신부종과 간헐적 발열증상을 주소로 내원하였다. 과거력상 15년전 당뇨와 고혈압 진단받고 약물치료와 인슐린 치료 중이었다. 가족력상 특이사항은 없었다. 진찰 소견에서 내원 당시 활력 징후는 190/130 mmHg, 맥박수 76회/분, 호흡수 20회/분, 체온 37.1℃ 이었다. 신체검사서 환자는 만성병색을 보였고, 의식은 명료하였다. 결막은 창백하였으며 복부 진찰 상 복부 불편감을 호소하였으나 압통이나 반사통은 없었다. 또한 경골 앞 함요 부종이 관찰되었다. 내원당시 혈액 검사에서 혈색소 8.3 g/dL, 백혈구 11,060/ $\mu$ L, 혈소판 98,000/ $\mu$ L 이었고, 그물세포는 (reticulocyte) 5.05%, Coombs

**Key Words :** 혈구탐식림프구조직구증, 신증후군, 급성신부전

Hemophagocytic lymphohistiocytosis, Nephrotic syndrome